

12. Cvičení z MA I. (17.12.2014)

Co je to derivace? Jaké znáte věty pro derivace, k čemu se využívá? Jak se počítá derivace – aritmetika derivací, derivace složené funkce, derivace inverzní funkce. Co je jednostranná derivace a jak se počítá?

1. Určete ve všech bodech definičního oboru funkcí, zda existují (jednostranné) derivace, případně čemu se rovnají. Lze tyto funkce spojitě rozšířit?

- (a) $\operatorname{sgn} x$ (b) $|x|$ (c) $\frac{1}{4} \ln \frac{x^2-1}{x^2+1}$ (d) $|\frac{x-1}{1-2x}|$ (e) $\frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}}$
 (f) $\sqrt[3]{(1 - \exp(1 - x^2))^2}$ (g) $\sqrt{1 - \exp(-x^2)}$

2. Najděte extrémy funkcí.

- (a) $x\sqrt{2-x^2}$ (b) $\sin^3 x + \cos^3 x$ (c) $\arccos\left(\frac{-x^2-x+2}{4}\right)$
 (d) $|\frac{x}{1+x^2}|$ (e) $2\sqrt{1-x^2} + \arctg \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

3. Ještě další derivace:

- (a) $\arcsin|\frac{5x+2}{3x-6}|$ (b) $\sqrt{\sin x \cos x}$ (c) $\sqrt{\arctg(\ln^2 x)}$

4. A ještě nějaké limity – l'Hospitalovo pravidlo:

- (a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^k}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\exp(-\frac{1}{x^2})}{x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} (\tg^2 x)^{\sin^2 x}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ (e) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{\sin 2x}$ (f) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln(1 - \frac{2}{x})$
 (g) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln \sqrt{x}$ (h) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{3x} - \frac{1}{\sin x}\right)$ (i) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$

Dú. (6.1.2015) Vypočtěte derivace funkcí (včetně jednostranných) – 1,5 bodu za příklad:

- (a) $f(x) = (x-a)^2(x-b)^2$ pro $x \in (a, b)$, $f(x) = \frac{1}{e}$ pro všechna ostatní x
 (b) $g(x) = x^2 e^{-x^2}$ pro $|x| \leq 1$, $g(x) = \frac{1}{e}$ pro $|x| > 1$

Bonusový příklad.

Určete ve všech bodech definičního oboru následující funkce f , zda existují (jednostranné) derivace, případně čemu se rovnají. Lze tuto funkci spojitě rozšířit?

$$f(x) = (\sin x)^{|\cos x|}$$

Výsledky:

- 1a.** $x \in R - \{0\} : f'(x) = 0, f'(0) = +\infty$
- 1b.** $x \in R - \{0\} : f'(x) = \operatorname{sgn} x, f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1$
- 1c.** $x \in (-\infty; -1) \cup (1; \infty) : f'(x) = \frac{x}{x^4 - 1}$
- 1d.** $x \in R - \{\frac{1}{2}, 1\} : f'(x) = \operatorname{sgn}(\frac{x-1}{1-2x}) \frac{-1}{(1-2x)^2}, f'_+(1) = 1, f'_-(1) = -1$
- 1e.** $x \in (1, +\infty) : f'(x) = \frac{(\ln x)^x}{x^{\ln x}} (\ln(\ln x) + \frac{1}{\ln x} - \frac{2}{x} \ln x);$ lze spoj. rozš. v 1:
 $\bar{f}(1) = 0$
- 1f.** $x \in R - \{-1, 1\} : f'(x) = \frac{4}{3} \frac{xe^{(1-x^2)}}{\sqrt[3]{1-e^{1-x^2}}}, f'_+(1) = +\infty = f'_-(-1), f'_-(1) = -\infty = f'_+(-1)$
- 1g.** $x \in R - \{0\} : f'(x) = \frac{xe^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-x^2}}}, f'_+(0) = 1, f'_-(0) = -1$
- 2a.** $D_f = < -\sqrt{2}; \sqrt{2} >; \min f(x) = f(-1) = -1, \max f(x) = f(1) = 1$
- 2b.** $D_f = R; \min f(x) = f(\frac{\pi}{2} + (2k+1)\pi) = f((2k+1)\pi) = -1, \max f(x) = f(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) = f(2k\pi) = 1;$ lokální maxima v b. $\frac{\pi}{4} + 2k\pi$, lokální minima v b. $\frac{\pi}{4} + (2k+1)\pi$
- 2c.** $D_f = < -3; 2 >; \min f(x) = f(-\frac{1}{2}), \max f(x) = f(-3) = f(2)$
- 2d.** $D_f = R; \min f(x) = f(0) = 0, \max f(x) = f(-1) = f(1) = \frac{1}{2}$
- 2e.** $D_f = < -1; 1 >; \max f(x) = f(\frac{1}{2}) = \sqrt{3} + \frac{\pi}{6};$
 minima nenabývá (lze sp. rozš.: $\bar{f}(-1) = -\frac{\pi}{2}, \bar{f}(1) = \frac{\pi}{2}; \bar{f}$ nabývá min. v b. -1)
- 3a.** $D_f = < -4, \frac{1}{2} >; f'(x) = \frac{6 \operatorname{sgn}(5x+2)}{(x-2)\sqrt{2(x+4)(1-2x)}} \text{ pro } x \neq -\frac{2}{5}; f'_+(-\frac{2}{5}) = +\frac{25}{36}, f'_-(-\frac{2}{5}) = -\frac{25}{36}, f'_+(-4) = -\infty, f'_+(\frac{1}{2}) = +\infty$
- 3b.** $D_f = \cup < k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi >; f'(x) = \frac{\frac{1}{2} \cos^2 x - \sin^2 x}{\sqrt{\sin x \cos x}} \text{ pro } x \in \cup(k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)^\circ$
 $f'_+(2k\pi) = +\infty = f'_+(\pi + 2k\pi), f'_-(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) = -\infty = f'_-(\frac{3\pi}{2} + 2k\pi)$
- 3c.** $D_f = (0, +\infty); f'(x) = \frac{\ln x}{x(1+\ln^4 x)\sqrt{\arctg(\ln^2 x)}}; \text{ pro } x \neq 1; f'_+(1) = 1, f'_-(1) = -1$
- Dú.** $f'(x) = 2(x-a)(x-b)(2x-a-b) \text{ pro } x \in (a, b); f'_+(a) = f'_-(a) = f'_+(b) = f'_-(b) = 0; f'(x) = 0 \text{ pro } x \in (-\infty, a) \cup (b, \infty)$
- Dú.** $g'(x) = 2xe^{-x^2}(1-x^2) \text{ pro } x \in (-1, 1); f'_-(1) = f'_+(1) = f'_+(-1) = f'_-(-1) = 0; f'(x) = 0 \text{ pro } x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$