

## 2. Cvičení z MA I. (13. a 14. 10.2015)

Markéta Lopatková

ufal.mff.cuni.cz/course/nmai054

Jak probíhá důkaz? Co je to přímý důkaz, nepřímý důkaz a co důkaz sporem?

**5. AG nerovnost:** Pro kladná reálná  $x_1, \dots, x_n$  platí:

$$\sqrt[n]{x_1 \dots x_n} \leq \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n)$$

Dokažte pro  $n = 2$ .

A. VÝROKOVÁ LOGIKA (ještě z minulé hodiny)

**7.** Rozhodněte o pravdivosti a negujte:

(a)  $\forall x \in N \quad \exists y \in N \quad \forall z \in N$  platí:  $z > x \Rightarrow y < z$

(b)  $\exists y \in N \quad \forall x \in N \quad \forall z \in N$  platí:  $z > x \Rightarrow y < z$

(c)  $\exists y \in N \quad \forall x \in N \quad \forall z \in R$  platí:  $z > x \Rightarrow y < z$

**8.** Dokažte, že následující výroky jsou ekvivalentní:

(a)  $A \Rightarrow B, \neg B \Rightarrow \neg A, \neg(A \& \neg B), \neg A \vee B$

(b)  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow C, A \Rightarrow (B \Rightarrow C)$

**9.** Který z následujících výroků je silnější?

(a)  $\forall x \in R \quad \exists K > 0, K \in R$  takové, že  $|f(x+1) - f(x)| \leq K$

(b)  $\exists K > 0, K \in R \quad \forall x \in R$  takové, že  $|f(x+1) - f(x)| \leq K$

B. Jak probíhá důkaz MATEMATICKOU INDUKCÍ?

**1.** Dokažte, že pro všechna přirozená  $n$  platí:

(a)  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  (b)  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(c)  $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \quad (= \left(\sum_{k=1}^n k\right)^2)$

$$(d) \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} > \sqrt{n} \quad \text{pro } n \geq 2 \quad (e) \quad \text{Vypočítejte pro } x \in R: \quad \sum_{k=1}^n x^k$$

**2.** Dokažte tzv. de Morganova pravidla pro množiny  $A$  a  $B_i$  ( $i = 1 \dots n$ ):

$$(a) \quad A \setminus \bigcap_{i=1}^n B_i = \bigcup_{i=1}^n (A \setminus B_i)$$

$$(b) \quad A \setminus \bigcup_{i=1}^n B_i = \bigcap_{i=1}^n (A \setminus B_i)$$

**3.** Dokažte pro všechna přirozená  $n$ :

$$(a) \quad (2n)! < 2^{2n}(n!)^2 \quad (b) \quad n^2 \leq 2^n$$

**4.** Dokažte pro všechna přirozená  $n$  a reálná  $x$  taková, že  $0 \leq x_k \leq \pi$  :

$$|\sin(\sum_{k=1}^n x_k)| \leq \sum_{k=1}^n \sin x_k$$

**Domácí úkol (19. a 20.10.):** Dokažte pro všechna přirozená  $n$ , kde  $e$  je základ přirozeného logaritmu:

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n \leq n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$$

(Nápověda: pro horní odhad lze užít AG nerovnost; dále platí  $(1 + \frac{1}{n})^n \leq e$ )

**Bonus (těžké!!):** Dokažte AG nerovnost pro všechna  $x_i \in R, x_i \geq 0$  a  $n \in N$ :

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$